
































Grupo de Trabajo sobre
Tratamientos del VIH (gTt)
Email info@gtt-vih.org
Web www.gtt-vih.org



Tabla de fármacos antirretrovirales

Nombre genérico	Nombre comercial	Formulación	Dosis estándar en adultos	Pastillas/día	Principales efectos secundarios	Rest. alimentarias	
Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósido (ITIN)							
3TC, lamivudina	<i>Epivir</i>	 300	Comprimidos de 150* y 300mg	150mg dos veces al día o 300mg una vez al día	2 1	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, dolor abdominal, pérdida de cabello, fiebre, insomnio, exantema cutáneo (<i>rash</i>), cansancio, congestión nasal, dolor articular. Raros: Acidosis láctica, daño hepático.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
Abacavir	<i>Ziagen</i>	 300	Comprimido de 300mg	300mg dos veces al día o 600mg una vez al día	2	Habituales: Exantema cutáneo (<i>rash</i>), náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, pérdida de apetito. Raros: Reacción de hipersensibilidad, acidosis láctica.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
AZT, zidovudina	<i>Retrovir</i>	 250	Cápsulas de 100 y 250mg*	250mg dos veces al día	2	Habituales: Náuseas, vómitos, fatiga, dolor de cabeza, mareos, debilidad, dolor muscular, pérdida de apetito, fiebre. Raros: Anomalías sanguíneas, lipoatrofia, acidosis láctica.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
d4T, stavudina	<i>Zerit</i>	 40	Cápsulas de 20, 30 y 40mg*	P. de más de 60kg: 40mg dos veces al día P. de menos de 60kg: 30mg dos veces al día	2	Habituales: Lipoatrofia, neuropatía periférica, náuseas, diarrea, dolor abdominal, ardor de estómago, mareos, cansancio, exantema (<i>rash</i>), picores. Raros: Pancreatitis, acidosis láctica.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
ddI, didanosina (liberación prolongada)	<i>VidexEC</i>	 400	Cápsulas de 125, 200, 250 y 400mg*	P. de más de 60kg: 400mg una vez al día o 200mg dos veces al día. P. de menos de 60kg: 250mg una vez al día o 125mg dos veces al día.	1 o 2	Habituales: Neuropatía periférica, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, exantema cutáneo (<i>rash</i>), dolor de cabeza. Raros: Pancreatitis, acidosis láctica.	Tomar al menos dos horas después de comer o beber (excepto agua) y esperar otras dos horas antes de volver a comer o beber
FTC, emtricitabina	<i>Emtriva</i>	 200	Cápsula de 200mg	200mg una vez al día	1	Habituales: Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, niveles elevados de quinazas, oscurecimiento de la piel en niños. Raros: Acidosis láctica, daño hepático.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleótido (ITINt)							
Tenofovir	<i>Viread</i>	 300	Comprimido de 300mg	300mg una vez al día	1	Habituales: Náuseas, vómitos, diarrea, mareos, bajos niveles de fosfato en sangre, debilidad, exantema cutáneo (<i>rash</i>), dolor de cabeza, dolor de estómago, fatiga, hinchazón, flatulencias. Raros: Problemas renales, disminución de la masa ósea.	Tomar con alimentos
Combinaciones en dosis fija de ITIN/ITINt							
3TC / AZT	<i>Combivir</i>	 150/300	Comprimido que incluye 150mg de 3TC y 300mg de AZT	Un comprimido dos veces al día	2	Véase 3TC y AZT.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
3TC / abacavir / AZT	<i>Trizivir</i>	 150/300/300	Comprimido que incluye 150mg de 3TC, 300mg de abacavir y 300mg de AZT	Un comprimido dos veces al día	2	Véase 3TC, abacavir y AZT.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
3TC / abacavir	<i>Kivexa (UE)</i>	 300/600	Comprimido que incluye 300mg de 3TC y 600mg de abacavir	Un comprimido una vez al día	1	Véase 3TC y abacavir.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
FTC / tenofovir	<i>Truvada</i>	 200/300	Comprimido que incluye 200mg de FTC y 300mg de tenofovir	Un comprimido una vez al día	1	Véase FTC y tenofovir.	Tomar con alimentos
Combinaciones en dosis fija de ITIN/ITINt/ITINN							
FTC / tenofovir / efavirenz	<i>Atripla</i>	 600/300/200	Comprimido que incluye 600mg de efavirenz, 200mg de FTC y 300mg de tenofovir	Un comprimido una vez al día	1	Véase FTC, tenofovir y efavirenz.	Tomar con el estómago vacío, preferiblemente a la hora de irse a la cama
FTC / rilpivirina / tenofovir	<i>Eviplera (UE)</i>	 200/25/300	Comprimido que incluye 200mg de FTC, 25mg de rilpivirina y 300mg de tenofovir	Un comprimido una vez al día	1	Véase FTC, rilpivirina y tenofovir.	Tomar con una comida
Inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósido (ITINN)							
Efavirenz	<i>Sustiva Stocrin</i>	 600	Comprimido de 600mg* y cápsula de 200mg	600mg una vez al día	1 o 3	Habituales: Exantema cutáneo (<i>rash</i>), mareos, alteraciones del sueño, sueños anómalos, problemas de concentración, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, cansancio, diarrea, ansiedad, depresión. Raros: Psicosis, exantema cutáneo (<i>rash</i>) grave, problemas hepáticos.	Tomar con el estómago vacío, preferiblemente a la hora de irse a la cama
Etravirina	<i>Intelence</i>	 200	Comprimidos de 100 y 200mg*	200mg dos veces al día	2 o 4	Habituales: Exantema cutáneo (<i>rash</i>), neuropatía periférica. Raros: Exantema cutáneo (<i>rash</i>) grave (síndrome de Stevens Johnson).	Tomar con alimentos
Nevirapina	<i>Viramune</i>	 200	Comprimido de 200mg	200mg una vez al día durante dos semanas posteriormente , 200mg dos veces al día	2	Habituales: Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema cutáneo (<i>rash</i>), náuseas, dolor de cabeza, fatiga, dolor de estómago, diarrea. Raros: Exantema cutáneo (<i>rash</i>) grave (síndrome de Stevens Johnson).	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
Nevirapina (liberación prolongada)	<i>Viramune XR</i>	 400	Comprimido de 400mg	400mg una vez al día tras un periodo de introducción con nevirapina de liberación no prolongada	1	Habituales: Toxicidad hepática, reacción alérgica, exantema cutáneo (<i>rash</i>), náuseas, dolor de cabeza, fatiga, dolor de estómago, diarrea. Raros: Exantema cutáneo (<i>rash</i>) grave (síndrome de Stevens Johnson).	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
Rilpivirina	<i>Edurant</i>	 25	Comprimido de 25mg	25mg una vez al día	1	Habituales: Insomnio, dolor de cabeza, exantema (<i>rash</i>), cambios de humor, depresión. Raros: En dosis superiores a 25mg puede provocar alteraciones del ritmo cardiaco.	Tomar con una comida
Inhibidores de la proteasa							
Atazanavir	<i>Reyataz</i>	 300/200	Cápsulas de 150, 200* y 300mg	300mg con 100mg de ritonavir una vez al día o 400mg con 100mg de ritonavir una vez al día con efavirenz o nevirapina	2 o 3 §	Habituales: Náuseas, diarrea, exantema cutáneo (<i>rash</i>), dolor estomacal, dolor de cabeza, insomnio (dificultad para dormir), vómitos, hiperbilirrubinemia, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, ardor de estómago, ictericia. Raros: Piedras renales, función hepática anómala, alteraciones en el ritmo cardiaco.	Tomar con alimentos
Darunavir	<i>Prezista</i>	 600	Comprimidos de 400 y 600mg*	600mg con 100mg de ritonavir dos veces al día o 800mg con 100mg de ritonavir una vez al día	3 o 4 §	Habituales: Diarrea, náuseas, exantema cutáneo (<i>rash</i>), dolor de estómago, vómitos, dolor de cabeza, fatiga, dolor de estómago, diarrea. Raros: Función hepática anómala, alteraciones del ritmo cardiaco.	Tomar con alimentos
Fosamprenavir	<i>Telzir</i>	 700	Comprimido de 700mg	700mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	4 §	Habituales: Niveles elevados de lípidos, náuseas, vómitos, diarrea, exantema cutáneo (<i>rash</i>), dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos, cansancio, hormigueo alrededor de la boca, alteraciones de la función hepática y del páncreas, toxicidad hepática, diabetes. Raros: Exantema cutáneo (<i>rash</i>) grave, alteraciones del ritmo cardiaco.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
Indinavir	<i>Crixivan</i>	 400	Cápsulas de 100, 200 y 400mg*	800mg tres veces al día	6	Habituales: Piedras renales, dolor abdominal, lipodistrofia, náuseas, vómitos, ardor de estómago, diarrea, exantema cutáneo (<i>rash</i>), dolor de cabeza, mareos, sequedad de piel y boca, cansancio, insomnio, toxicidad hepática, diabetes, cambios en los recuentos sanguíneos, debilidad. Raros: Anomalías hepáticas, alteraciones en el ritmo cardiaco.	Tomar una hora antes de comer o dos horas después, o acompañado de un aperitivo ligero y bajo en grasas
Lopinavir / ritonavir	<i>Kaletra</i>	 200/50	Comprimido que incluye 200mg de lopinavir y 50mg de ritonavir	Dos comprimidos dos veces al día o cuatro comprimidos una vez al día	4	Habituales: Lipodistrofia, niveles elevados de enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, debilidad, ardor de estómago, dolor de cabeza, niveles elevados de lípidos, toxicidad hepática, diabetes. Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
Ritonavir	<i>Norvir</i>	 100	Cápsula de 100mg* y comprimido de 100mg	Dosis completa: 600mg dos veces al día Para 'potenciar' otros IP: 100 - 200mg una o dos veces al día	12 1 a 4	Habituales (con la dosis completa): Niveles elevados de lípidos y enzimas hepáticas, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza, debilidad, insensibilidad alrededor de la boca, mal sabor de boca, lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes. Habituales (con la dosis baja): Niveles elevados de lípidos. Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco.	Tomar con alimentos para evitar las náuseas
Saquinavir	<i>Invirase</i>	 500	Cápsula de 200mg y comprimido de 500mg*	1000mg con 100mg de ritonavir dos veces al día	6 §	Habituales: Lipodistrofia, náuseas, vómitos, diarrea, exantema cutáneo (<i>rash</i>), cansancio, niveles elevados de enzimas hepáticas y de lípidos, toxicidad hepática, diabetes. Raros: Alteraciones del ritmo cardiaco.	Tomar en las dos horas siguientes a una comida
Tipranavir	<i>Aptivus</i>	 250	Cápsula de 250mg	500mg con 200mg de ritonavir dos veces al día	8 §	Habituales: Náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal, cansancio, dolor de cabeza, fiebre, anomalías hepáticas, exantema cutáneo (<i>rash</i>), lipodistrofia, toxicidad hepática, diabetes, aumentos de lípidos, flatulencia. Raros: Hemorragia cerebral, alteraciones del ritmo cardiaco.	Tomar con alimentos
Inhibidores de la fusión							
T-20, enfuvirtida	<i>Fuzeon</i>	 90	Polvo para disolver en agua	Inyección subcutánea de 90mg dos veces al día	-	Habituales: Reacción en el punto de inyección, infecciones del tracto respiratorio, neuropatía periférica, pérdida de peso.	Sin restricciones alimentarias
Inhibidores del CCR5							
Maraviroc	<i>Celsentri</i>	 300	Comprimidos de 150mg* y de 300mg	300mg dos veces al día o 150mg dos veces al día con todos los IP potenciados con ritonavir excepto tipranavir o 600mg dos veces al día con efavirenz o etravirina	2 a 4	Habituales: Náuseas, diarrea, fatiga, dolor de cabeza.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos
Inhibidores de la integrasa							
Raltegravir	<i>Isentress</i>	 400	Comprimido de 400mg	400mg dos veces al día	2	Habituales: Dolor de cabeza, insomnio. Raros: Exantema cutáneo (<i>rash</i>) grave, reacción de hipersensibilidad.	Se puede tomar acompañado o no de alimentos

*Formulación mostrada. § Incluyendo la/s cápsula/s de ritonavir.

NAM y gTt han adoptado todas las precauciones razonables en la elaboración de esta publicación. Los editores no se hacen responsables de cualquier imprecisión, error o hecho más allá de su control. La inclusión de información sobre cualquier tratamiento o terapia no supone una aceptación de los mismos por parte de los editores. La información debería emplearse siempre acompañada de asesoramiento médico profesional.

NAM Londres, Reino Unido gTt Barcelona, España. Diciembre 2011.